

ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА профилактики, диагностики и ликвидации хламидиоза животных

ГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящими Ветеринарно-санитарными правилами профилактики, диагностики и ликвидации хламидиоза животных (далее – Правилами), разработанными в соответствии с Законом Республики Беларусь от 2 июля 2010 года «О ветеринарной деятельности» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 170, 2/1713; Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 01.11.2016, 2/2436) и рекомендациями Кодекса здоровья наземных животных Международного эпизоотического бюро (2017 год), устанавливаются обязательные для соблюдения юридическими и физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, требования к безопасности работ и услуг, связанных с содержанием, выращиванием, разведением, перемещением, реализацией, убоем животных, утилизацией, захоронением, уничтожением трупов животных, продуктов животного происхождения, производством, переработкой и перемещением продуктов животного происхождения, реализацией продуктов животного происхождения, направленные на профилактику, диагностику и ликвидацию хламидиоза животных.

2. В настоящих Правилах применяются термины и их определения в значениях, установленных Законом Республики Беларусь «О ветеринарной деятельности», а также следующие термины и их определения:

- замкнутый цикл – технологический способ организации племенной работы, обуславливающий ее проведение в условиях племенного хозяйства;
- карантинирование – содержание животных в изоляции от других животных;
- неблагополучный пункт по хламидиозу – населенный пункт, животноводческая ферма, пастбище, урочище, скотопрогонная трасса на территории, которых обнаружен очаг заразной болезни животных (хламидиоза) независимо от срока давности его возникновения;
- подозрительные на хламидиоз животные – животные, у которых выявлены сомнительные реакции в реакции длительного связывания комплемента (далее – РДСК);
- хламидиоз – заразная болезнь животных, характеризующаяся у молодняка ринитом, бронхопневмонией, гастроэнтеритом, полиартритом, кератоконъюнктивитом, энцефаломиелитом, у взрослых животных – абортами, задержанием последа, эндометритами, маститами и рождением нежизнеспособного молодняка;
- благополучный пункт по хламидиозу – населенный пункт, животноводческая ферма, пастбище, урочище, скотопрогонная трасса, на территории которых не обнаружен очаг заразной болезни животных.

ГЛАВА 2 ПРОФИЛАКТИКА ХЛАМИДИОЗА ЖИВОТНЫХ

3. В целях профилактики хламидиоза животных юридические и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, обязаны:

- проводить закупку, ввоз (вывоз) или ввод (вывод) животных, спермы, эмбрионов из благополучных пунктов по хламидиозу;
- проводить в течение 30 дней карантинирование вновь поступивших животных для проведения лабораторных исследований (испытаний);
- проводить перегруппировку животных внутри сельскохозяйственной организации по согласованию со специалистами в области ветеринарии данной сельскохозяйственной организации;
- обеспечивать проведение дезинфекции, дератизации и дезинсекции помещений для животных и прилегающих к ним территорий;
- обеспечивать учет случаев аборт, мертворождения и падежа животных;
- направлять патологический материал, сыворотку крови от абортировавших животных и растелившихся мертвым плодом в ветеринарную лабораторию для проведения лабораторных исследований (испытаний).

Для специфической профилактики хламидиоза в сельскохозяйственных организациях проводят вакцинацию животных вакцинами в соответствии с инструкциями по их применению.

4. При возникновении заболеваний хламидиозом вначале проводится лечение животных антибактериальными препаратами, а после прекращения выявления больных животных проводится иммунизация.

5. В селекционно-генетических центрах у всех животных продуцентов спермы, два раза в год с интервалом 6 месяцев необходимо исследовать сперму на контаминацию хламидиями и сыворотку крови на наличие антител, в соответствии с методическими указаниями по диагностике. При обнаружении хламидий в сперме, серопозитивных животных изолируют и сдают на убой. Ранее полученную от них сперму уничтожают.

ГЛАВА 3 ДИАГНОСТИКА ХЛАМИДИОЗА ЖИВОТНЫХ

6. Диагностика хламидиоза животных основывается на комплексном анализе эпизоотологических, клинических, патологоанатомических и лабораторных исследованиях (испытаниях).

7. Диагноз на хламидиоз считают установленным:

- при выделении возбудителя, антигена хламидий или ДНК хламидий из исследуемого материала и его идентификации;
- при получении нарастания титра антител в парных пробах сыворотки крови (через 15–21 день) больных или переболевших животных в РДСК в два и более раза.

ГЛАВА 4 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЛИКВИДАЦИИ ХЛАМИДИОЗА ЖИВОТНЫХ

8. При установлении диагноза запрещается:

- вывод или ввод поголовья в неблагополучный пункт по хламидиозу;

- перегруппировка животных без согласования специалиста в области ветеринарии данной организации;
- совместный выпас животных из неблагополучных пунктов по хламидиозу с другими животными;
- использование для поения животных пруды и другие естественные водоемы;
- реализация мяса от вынужденно убитых больных хламидиозом животных в сыром виде, за исключением его вывоза для переработки в организации, осуществляющие деятельность по переработке мяса. Шкуры подвергают дезобработке;
- проведение хирургических операций, кроме неотложных.

9. В очаге заразной болезни животных специалист в области ветеринарии проводит клиническое обследование поголовья, и по его результатам животных делят на две группы:

- первая – больные животные. К ней относят животных, имеющих клинические признаки болезни или повышенную температуру тела. Этим животных подвергают лечению. Через 14 дней после клинического выздоровления их прививают противохламидиозной вакциной;
- вторая – животные, не указанные в абзаце втором настоящего пункта, животных этой группы вакцинируют противохламидиозной вакциной с последующим (в течение 3 дней) ежедневным клиническим осмотром и термометрией.

10. Для ухода за больными и подозрительными на хламидиоз животными закрепляют отдельный обслуживающий персонал. Его обеспечивают специализированной одеждой, дезинфицирующими средствами, аптечками первой помощи, средствами личной гигиены.

11. Спецодежду, щетки, скребницы, ведра и другой мелкий инвентарь обеззараживают путем погружения на 4 часа в 1%-й активированный раствор хлорамина, 4%-й раствор формальдегида или кипятят в 2%-м растворе кальцинированной соды не менее 90 минут или другими, эффективными при хламидиозе, дезинфицирующими средствами, согласно инструкции по их применению.

12. Молоко от животных первой группы в течение всего периода лечения подлежит кипячению в течение 30 минут и уничтожению.

13. Племенная работа проводится по принципу «замкнутого цикла», не допуская перевода молодняка и взрослых животных в благополучные пункты по хламидиозу.

14. Навоз подвергают биотермическому обезвреживанию в течение не менее 12 месяцев.

15. В летний период животных из неблагополучных пунктов допускается переводить на лагерное содержание, а в животноводческих помещениях проводить механическую очистку, мойку, дезинфекцию и санитарный ремонт.

16. Молодняк, полученный от животных из неблагополучных пунктов по хламидиозу, выращивают отдельно, вакцинируют в сроки, предусмотренные инструкцией по применению вакцины против хламидиоза.

17. В помещениях, где находятся больные животные необходимо строго соблюдать параметры микроклимата: в зимний период температура должна быть не менее +15 °С, относительная влажность – 75%, скорость движения воздуха – 0,3–0,5 м/с, содержание

углекислого газа 0,2%, аммиака – 0,2 мг/л. В теплый период года скорость движения воздуха должна быть 0,5–0,8 м/с. В помещениях не допускать сквозняков.

18. Убой больных и подозрительных на хламидиоз животных производится на санитарной бойне или в конце смены, или в санитарный день на общем конвейере.

На всех этапах технологического процесса по переработке сырья (загоны, кровесборные желоба и емкости, оборудованные помещения, транспорт) подлежат тщательной очистке и последующей дезинфекции 5%-м раствором гипохлорита кальция или другими эффективными при хламидиозе, дезинфицирующими средствами, согласно инструкции по применению.

19. Разрабатывается схема ветеринарных мероприятий и согласовывается главным государственным ветеринарным врачом района, города – главным государственным ветеринарным инспектором района, города или его заместителем. Больных животных подвергают лечению антибактериальными, сывороточными и симптоматическими препаратами.

20. Профилактическую дезинфекцию, в том числе и в присутствии животных при хламидиозе проводят 2 раза в год (весной и осенью), текущую – по мере выявления больных животных.

21. Ограничительные мероприятия с неблагополучного пункта по хламидиозу снимают после проведения комплекса организационно-хозяйственных и ветеринарных мероприятий, лабораторных исследований (испытаний), по результатам которых не будут выявлены специфические антитела в диагностических титрах (1:10 и выше) при исследовании в серологических реакциях в сыворотках крови животных.

После снятия ограничительных мероприятий на хламидиоз животных запрещается их продажа в течение 2 лет.