

Сталосан Ф

Поскольку просто дезинфекции недостаточно, предлагаем Вам универсальное средство которое дезинфицирует, дезинвазирует, контролирует микроклимат (связывает аммиак и сероводород и нормализует влажность)



Сталосан Ф

Сталосан Ф – дезинфицирующее средство в форме порошка красно-коричневого цвета.

В 100,0 г препарата содержится меди сульфата – 1,46 г, кальция дифосфат – 10,0 г; кальция монофосфат – 30,0 г; кальция сульфат – 45,25 г; железа сульфат – 1,46 г; железа окись – 2,71 г и кремниевая глина – 9,07 г.

Спектр действия:

уничтожает бактерии, вирусы, грибки, паразитов, их личинки и яйца, а так же личинки насекомых

адсорбирует аммиак, сероводород и другие вредные газы

впитывает воду и жидкие фракции выделений животных

блокирует действие уреазы.

Сталосан Ф может применяться для вынужденной дезинфекции в период лечения животных, что даст очень хорошие результаты, но реальная выгода будет от непрерывного использования для профилактики заболеваний.

Сталосан Ф применяется для следующих ЖИВОТНЫХ:

▶ Свины

▶ КРС

▶ Домашняя птица

▶ Лошади

а также

▶ Козы

▶ Овцы

▶ Собаки

▶ Коты

▶ Кролики

и для экзотических животных:

▶ Ламы

▶ Альпаки ... и др.

Сталосан Ф

Для достижения максимального результата тщательно подобран компонентный состав **Сталосан Ф** действующий в разных направлениях усиливая силу действия друг друга

- Содержит **активные соли металлов**, которые уничтожают болезнетворные микроорганизмы.

- Содержит **металлы**, которые уничтожают болезнетворные микроорганизмы.

- Содержит **минералы**, которые присоединяются к бактериям, вирусам, грибкам, паразитам и личинкам насекомых, что приводит к прерыванию цикла их развития.

- Содержит **минералы**, которые обезвоживают паразитов и личинки червей, что приводит к их уничтожению.


Сталосан Ф

**Кроме того для достижения
максимального эффекта
подобран не только
компонентный состав, но и
размер частиц, благодаря чему
возможны три вида нанесения
средства предлагаемые
производителем:**

- **Ручное посыпание**
- **Механическое посыпание**
- **Механическое распыление**



Сталосан Ф

- Механическое посыпание



Сталосан Ф

■ Механическое распыление



Сталосан Ф

Применение

Порядок применения

Рекомендовано вносить **Сталосан Ф** с нормой 50,0 г/м² один раз в сутки в течение первых трех дней подряд. Далее **Сталосан Ф** должен применяться один в неделю с той же нормой. В случае повышения вероятности возникновения инфекции, а также при повышенной концентрации аммиака и сероводорода в помещении препарат применяют 2-3 раза в неделю с нормой расхода 50,0 г/м².

Сталосан Ф наносится непосредственно на существующую подстилку для скота, особенно в местах, где влажно и сыро. **Сталосан Ф** используется в присутствии животных без какого либо вреда для них. Для оптимального эффекта и безопасности **Сталосан Ф** должен наноситься как можно равномерней в местах, доступных для животных.

Кроме того при механическом распылении Сталосан Ф можно нанести максимально равномерно и, что особенно важно, при таком нанесении происходит санация воздуха в помещении и происходит наиболее полное адсорбирование вредных газов.



Сталосан Ф

Дезинфицирующая и дезинвазирующая активность

Сталосан Ф эффективен в борьбе с:

■ Бактериями

- Actinobacillus
- Salmonella enteritidis
- Salmonella typhimurium DT 104
- Salmonella typhimurium
- Salmonella dublin
- Salmonella
- Pseudomonas paucimobilis
- Pseudomonas aeruginosa
- Proteus mirabilis
- Serratia marcescens
- Staphylococcus
- Streptococcus pyogenes
- Streptococcus faecalis
- Streptococcus uberis
- Staphylococcus hyicus
- Staphylococcus epidermis
- Staphylococcus aureus
- Staphylococcus
- Proteus
- Clostridium tyrobutyricum
- Coliforme bakterier
- E. coli
- Clostridium perfringens
- Bacillus subtilis
- Eschericia coli
- Haemophilus
- Micrococcus varians
- Pseudomonas fluorescent
- Fusobacterium necrophorum
- Fusobacterium necrophorum
- Enterobacter agglomerans
- Enterobacter cloacal
- E. coli O 157 VDL 228
- E. coli O 149
- E. coli
- Aerococcus
- Pasteurella multocida

■ Вирусами

- ECBO - Virus
- Reo - Virus
- Vaccinia - Virus
- Newcastle Disease Virus
- Porcine Parvovirus
- Canine Parvovirus

■ Паразитами

- E. acervulina (chicken coccidia)
- Capillaria obsignata
- Heterakis gallinarum
- Ascarida galli
- Ascaris suum (Round worm)
- Capillaria obsignata

■ Грибками

- Alternaria
- Aspergillus
- Aspergillus flavus
- Candida pseudotropicalis
- Candida parapsilosis
- Candida lusitanae
- Candida torulopsis
- Candida rogosa
- Candida ciferii
- Cladosporium
- Cladosporium herbarum
- Cryptococcus laurentii
- Fungi imperfecte
- Fusarium
- Heminthosporum
- Maris torulopsis
- Mucor
- Mucor plumbeus
- Penicilium
- Penicilium viridicatum
- Pullularia
- Rhodotorula glutinis
- Saccharomyces cerevisiae
- Torulopsis maris
- Torulopsis candida
- Torulopsis candida
- Trichosporon beigeli
- Trichoderma viride
- Verticillium cinnabarium
- Trichosporon beigeli
- Trichoderma viride
- Verticillium cinnabarium

■ Личинками мух

■ Влажностью



■ Аммиаком

■ Водным сульфидом.





Сравнительная характеристика уровней болезнетворных микроорганизмов в течение производственного цикла без применения и с применением Сталосан Ф




Сталосан Ф

Связывающая способность




При разработке дезсредства Сталосан Ф предполагалась проявления сорбирующих свойств которые в последующем были подтверждены в ходе лабораторных испытаний причем в присутствии аммиака эти свойства значительно усиливаются.

(с аммиаком справа (приблизительно 1% раствор) и без аммиака слева). Причем в оба цилиндра добавлялось одинаковое количество Сталосан Ф



100г. Сталосан Ф связалось с 405г. Водного раствора аммиака.

Сталосан Ф






Испытания на фермах

Динамика общей микробной обсемененности при использовании Сталосан Ф в помещениях для циплят-бройлеров

Цель испытания: оценка преимуществ применения Stalosan F на птицеводческих предприятиях.

Испытания проведены на трех различных помещениях с общим количеством птицы 100,000 голов.

Заключение: В период применения Сталосан Ф наблюдался резкий спад микробной обсемененности поверхностей пола стен и конструкций.






Испытание в помещении для откорма свиней

Результаты обработки свиноводческих помещений дезсредством Сталосан Ф:

- Более низкий падеж,
- Более низкие затраты на ветеринарные мероприятия
- Сокращение времени дезинфекции
- Улучшение микроклимата помещений
- Уменьшение степени перекрестного заражения
- Более быстрое восстановление животных после инфекционных заболеваний






Воздействие Сталосан Ф на неспорулированные ооцисты.

Сокращение степени споруляции ооцист

В результате применения **Сталосан Ф** резко снижается Степень споруляции ооцист одновременно на 50-56 %, в сравнении с обработанными другими средствами и на 80-82 % в сравнении с необработанными помещениями. В результате проводимых обработок во всех цехах по производству свинины снизился падеж:





Испытание в помещении для откорма свиней

Цель исследования

Оценить воздействие препарата **Сталосан Ф** на пригодность для птицеводческих помещений, экономическую пользу

Результаты

Сокращение уровня падежа (См. табл. 2)

Сохранение качества навоза (содержания аммиака) при хранении (См. табл. 3)

Существенное сокращение уровня аммиака (См. табл. 1)

Кроме того при применении **Сталосан Ф**:

Повышение перевариваемости корма более, чем на 1 %

Сокращение применения лекарственных препаратов до 80 %

Экономия на ветеринарные расходы около €4.20 на птицу

Таблица 1




Таблица 2




Таблица 3

